




Information till dig som har Malletfinger – droppfinger



Malletfinger är en vanlig skada som drabbar fingrets yttersta led. På fingrets yttersta ben fäster senan som sträcker ytterleden.

Om sträcksenan blir förlängd eller går av delvis eller helt så får du nedsatt förmåga eller oförmåga att sträcka fingrets ytterled (fingret droppar). Senskadan kan ibland vara kombinerad med ett benbrott på yttersta fingerbenet.

Skadan uppkommer oftast vid direkt våld mot fingertoppen, då fingertoppen kraftigt sträcks eller böjs genom slag (t.ex. bollspel), fall eller ryck (t.ex. fingret fastnar i klädesplagg el dyl.)

Vid misstanke om att senskadan är kombinerad med ett benbrott görs en röntgenundersökning. Du får en provisorisk skena och remitteras till ergoterapin

Behandling


Vanligen behandlas du med en skena som håller ytterleden helt stilla. Syftet är att få senan och benbrottet läkt under en tids fullständig vila. Senan är mycket känslig under läkningstiden. Hålls senan inte helt stilla i ett avslappnat läge finns det risk för att den åter blir förlängd eller går av.

Skenan används initialt dygnet runt i sex (till åtta) veckor. Därefter påbörjar du en successiv avveckling av skenan dagtid men använder skenan ytterligare 4 veckor på natten.

Tillsammans med din ergoterapeut planeras dina återbesök till ergoterapin.

Behandling med skena de första 6 veckorna

Skenan tillverkas av plast och formas efter ditt finger. Skenan fästs med tejp. Den ska sitta stabilt och hålla ytterleden helt rak och helst något översträckt. Du ska kunna röra fingrets mellanled utan hinder. **Skenan ska användas dygnet runt.**



Undvik att blöta ner fingret då skenan är på då huden under lätt blir uppluckrad.

OBS! Skenan **får endast** tas av för att kontrollera huden och för att försiktigt sköta fingrets hygien. Detta måste utföras med största försiktighet så att ytterleden hela tiden hålls i samma läge som i skenan. Instruktioner om hur detta skall göras får du av din ergoterapeut i samband med att skenan tillverkas.

Om du av någon anledning råkar böja ytterleden under de första 6 veckorna bör du börja om behandlingen från dag 1, d.v.s. påbörja en ny period med skena dygnet runt i 6 veckor.

Behandling efter ca 6 veckor

Du får en ny tid inbokad till ergoterapin och skenan tas bort i samband med besöket. Funktionen i skenan testas. Eventuellt kan du behöva fortsätta behandlingen några veckor till.

Därefter fortsätter behandlingen nattetid i ytterligare fyra veckor. Du ska inte träna böjning av ytterleden, utan endast ha med fingret i lätta grepp. Om du har ett tungt arbete bör du använda skenan i dessa arbetsmoment. Rörligheten i fingret återkommer successivt och du behöver oftast inte träna upp vare sig böjning eller sträckning i ytterleden.

Vid behov kan rörelseträning påbörjas efter vecka 8. Full normal användning av fingret tillåts efter 12 veckor.

Prognos

Trots att du följer programmet är det inte ovanligt med en liten kvarstående droptendens, dock inte i samma omfattning som vid skadetillfället. Denna droptendens ger oftast inga funktionella besvär.

Vid frågor vänligen kontakta ergoterapin på tel. (018) 538473, måndag till fredag 8.00-16.00.